БУЗ ВО ВОКЦМП
2016

Знаешь ли ты…

Знаешь ли ты…

- ВИЧ –один из самых опасных для человека вирусов. Он поражает иммунную систему, основная задача которой - защищать наш организм от инфекций.

- Он вызывает заболевание СПИД –

  синдром приобретенного иммунодефицита человека.

  Это конечная и самая тяжелая стадия развития ВИЧ-инфекции.

Актуальность.

Прошло четверть века с момента обнаружения первых случаев СПИДа. За это время СПИД радикально изменил наш мир: он унес жизни более 25 миллионов мужчин и женщин, сделал сиротами миллионы детей, усилил бедность и нищету, а в некоторых странах даже обратил вспять все усилия в области человеческого развития.

Сегодня около 40 миллионов человек живут с ВИЧ – половину из них составляют женщины. То, о чем вначале сообщалось, как лишь о нескольких случаях таинственного заболевания, сейчас превратилось в пандемию, которая является одной из самых серьезных угроз глобальному прогрессу в 21-м столетии.

Кофи А. Аннан
бывший Генеральный секретарь ООН (2006 г.)

История ВИЧ/ СПИДа.

- 1978 год – первое обнаружение симптомов СПИДа.
- 1983 год – открытие вируса иммунодефицита человека.
- 1987 год – зарегистрирован первый случай ВИЧ инфекции в России.
- 1991 год – от СПИДа умер Фре́дди Ме́ркьюри, лидер группы Квин.

История ВИЧ/ СПИДа.

- 1995 год – в России зарегистрировано 1200 человек с ВИЧ инфекцией.
- 1996 год – ВИЧ попадает в среду наркоманов, число больных стремительно растет (за год в 6 раз).
- 2001 год – в России объявлено начало эпидемии, зарегистрировано более150000 случаев ВИЧ инфекции.
- 2009 год – в России ежедневно заражаются ВИЧ инфекцией более 100 человек.

История ВИЧ/ СПИДа.

- Общее число россиян, инфицированных ВИЧ, зарегистрированных в Российской Федерации на 31 декабря 2014 г., составило **907 607** человек (по предварительным данным на 01.03.2015 г.).

Как передаётся ВИЧ-инфекция?

ВИЧ-инфекция в 51% случаев передаётся половым путём!!!

Как передаётся ВИЧ-инфекция?

- При внутривенном введении наркотиков.

Как передаётся ВИЧ-инфекция?

- При переливании крови, пересадке органов и тканей от инфицированного донора.

Как передаётся ВИЧ-инфекция?

- При использовании не стерильных медицинских инструментов.
- При прокалывании ушей.
- Других видах пирсинга.
- Татуировке.

Как передаётся ВИЧ-инфекция?

- **От инфицированной матери:**
- **внутриутробное заражение во время беременности;**
- **при родах;**
- **через грудное молоко ВИЧ-инфицированной матери.**

ВИЧ не передаётся:

- *при прикосновении и рукопожатии;*
- *при поцелуе;*
- *при объятиях;*
- *при питье из одного стакана;*
- *при пользовании общей одеждой или постельным бельем:*
- *при укусах насекомых и животных.*

Изменения в организме при ВИЧ инфекции.

- ВИЧ заражает прежде всего клетки иммунной системы - лимфоциты.
- Инфицированные лимфоциты постепенно гибнут.
- При достижении критического уровня количества клеток организм становится восприимчивым к различным инфекциям – развивается СПИД, что в конечном итоге становится причиной смерти.

Стадии болезни СПИДа.

- 1. Заражение вирусом ВИЧ: недельная лихорадка, увеличение лимфоузлов, сыпь. Через месяц в крови обнаруживаются антитела к вирусу ВИЧ.
- 2. Скрытый период: от нескольких недель до нескольких лет: изъязвления слизистой, грибковые поражения кожи, похудание, понос, повышенная температура тела.
- 3. СПИД: воспаления легких, опухоли, сепсис и другие инфекционные заболевания.

Как предупредить заражение ВИЧ?

- ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ
  НЕ ЗАБОЛЕТЬ ВИЧ –
  инфекцией –
  ЭТО
  ПРЕДОХРАНИТЬ
  СЕБЯ
  ОТ ВОЗМОЖНОСТИ
  ЗАРАЖЕНИЯ.

Как предупредить заражение ВИЧ?

- Безопасный секс.
  Исключай случайные половые контакты. При половых контактах используй презерватив. Должен быть постоянный половой партнёр.
- Неповрежденная кожа - надежный барьер для вируса.
- Следует использовать одноразовые и/или стерильные инструменты
  для медицинских и косметических услуг.

Как предупредить заражение ВИЧ?

- Откажись от медицинских услуг, если не уверен(а), что инструменты стерильные.
- Для маникюра или бритья используй только свои личные инструменты.
- Откажись от любого употребления наркотических средств.
- Если у тебя был/будет риск заражения ВИЧ, сдай кровь на анализ.



В каких случаях следует сдать анализ на ВИЧ?

- после полового контакта с новым партнером без презерватива
- после сексуального насилия
- если твой половой партнер вступал в половые контакты с кем-то еще
- если твой настоящий или прошлый половой партнер ВИЧ-инфицирован
- после использования одних и тех же игл или шприцев для введения наркотиков или других веществ, а также для татуировок и пирсинга
- после какого-либо контакта с кровью ВИЧ-инфицированного человека
- если твой партнер пользовался чужими иглами или подвергался какой-либо другой опасности инфицирования
- после обнаружения другой инфекции, передающейся половым путем

Лечение ВИЧ-инфекции.

- В настоящее время вакцины, способной предотвратить заражение ВИЧ и лекарства, способного уничтожить ВИЧ в организме, не существует.
- На данный момент разработаны препараты, позволяющие некоторое время поддерживать здоровье ВИЧ-инфицированных и оттягивать конечную стадию заболевания.

Ответственность.

- **В соответствии с действующим законодательством ВИЧ-инфицированные лица несут уголовную ответственность за несоблюдение правил по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции.**

Заключение.

- Жизнь полна радости и удовольствия.
- Сохраняя свое здоровье, мы сохраняем радость жизни!

Благодарю за внимание!